

کد سند: EDPa067 تاریخ تدوین ۱۴۰۳/۰۳/۰۱



بیمارستان فوق تخصصی اروژوی ایرانیا

Bilateral ureteral
obstruction

انسداد دو طرفه حالب

واحد آموزش سلامت

علائم هشدار:

- تب بیش از ۳۸ درجه سانتیگراد
 - مشکل در تنفس
 - خونریزی شدید
 - دردی که با داروی مسکن تسکین نیافته
 - قرمزی اطراف برش های جراحی
- لطفا به اولین واحد درمانی مراجعه نمایید .

منابع:

1. کتاب داخلی جراحی برونر و سودارث کلیه و مجاری ادراری - ترجمه ۲۰۲۰
2. سایت خدمات بهداشت ملی در انگلستان

مشهد- انتهای خیابان آخوند خراسانی - خیابان
رازی شرقی - روبه روی سالن ورزشی مهران
051-38587415
داخلی ۲۲۳ واحد آموزش سلامت

* توصیه های بعد از عمل جراحی:

- توصیه می شود که ۴ تا ۶ هفته پس از جراحی در خانه استراحت کنید.
 - استفاده از مسکن طبق نظر پزشک برای کنترل درد مجاز است .
 - بلند کردن وزنه های سنگین یا فشار آوردن (دراز نشست ، ورزش های سنگین) به مدت شش هفته اجتناب کنید.
 - همچنین باید تا **چهار هفته** پس از عمل از رابطه جنسی خودداری کنید .
 - استحمام بعد از ترخیص مانعی ندارد.
- بهتر است مایعات به میزان لازم حداقل ۸ لیوان میل نمایید.



* انسداد حالب چیست؟

حالب به لوله ای گفته می شود که مسئول انتقال ادرار از کلیه ها به سوی مثانه است. انسداد حالب ها می تواند باعث تورم و یا آسیب رسیدن به کلیه ها شود. این عارضه ممکن است در هر سنی به وجود بیاید، همچنین انسداد مجاری ادرار می تواند به صورت نادر در جنین مشاهده شود. انسداد حالب، گرفتگی یا انسداد در یک یا دو حالی است که ادرار را از کلیه ها به مثانه می برند. انسداد حالب عارضه نسبتاً شایعی است ولی چون قابل درمان است، به ندرت شاهد بروز علائم شدید هستیم. هر گونه انسداد در مسیر حالب، راه خروجی کلیه ها را مسدود می کند و در حقیقت عملکرد کلیه را مختل می سازد. انسداد می تواند کامل و یا نسبی باشد. در هر دو مورد هر چه زمان انسداد طولانی تر باشد احتمال بازگشت عملکرد کلیه کمتر می شود، بنابراین عامل انسدادی حالب هر چه سریعتر باید برطرف گردد.

* علائم انسداد حالب؟


- درد
- تغییر در مقدار ادرار تولید شده
- ادرار کردن دردناک
- وجود خون در ادرار
- عفونت های مجاری ادراری
- فشار خون بالا

* علل انسداد حالب چیست؟

1. وجود ناهنجاری در محل اتصال حالب به کلیه یا مثانه
2. فیبروز خلف صفاقی
3. سنگ های حالب
4. یبوست شدید
5. تومورهای سرطانی و غیرسرطانی
6. رشد بافت داخلی مثل بافت اندرومتریوز در خانم ها
7. تورم بلند مدت دیواره حالب، که معمولاً بر اثر بیماری های مثل توبرکلوزیس یا عفونت های انگلی اتفاق می افتد.

* درمان انسداد حالب چیست؟

هدف از درمان انسداد حالب، حذف انسداد و در صورت نبود امکان حذف عامل انسدادی باز کردن مسیر حالب برای جلوگیری از آسیب کلیوی و یا ترمیم کلیه است. در صورتی که عفونت وجود داشته باشد در کنار روش های درمانی، ممکن است از آنتی بیوتیک نیز استفاده شود. اگر انسداد حالب باعث درد شدید شود ممکن است به یک روش اورژانسی برای تخلیه ادرار از بدن به طور موقت و از بین بردن مشکلات ناشی از انسداد نیاز باشد. استفاده از استنت حالب و نفروستومی (تعبیه لوله تخلیه برای کلیه از طریق پوست) از این دسته می باشند.



روش جراحی برای برطرف کردن انسداد حالب ممکن است به صورت باز، اندوسکوپیک یا لاپاراسکوپیک انجام گیرد که انتخاب آن بستگی به علت ایجاد کننده انسداد و شرایط عمومی بیمار دارد. تفاوت اصلی میان این روش های جراحی، زمان بهبودی پس از عمل و تعداد و اندازه برش های مورد استفاده برای جراحی است.

انسداد حالب یک اورژانس ارولوژی محسوب می شود که در صورت ضرورت به صورت اورژانسی بیمار جهت رفع انسداد در کمترین زمان ممکن باید به اتاق عمل برود.

